



ŽLTÁČKA TYPU A CHOROBA ŠPINAVÝCH RÚK



To, že niekto blízky dostal žltáčku
neznamená, že ju musíte dostať aj vy.

Vírus sa vylučuje stolicou a nákaza sa
prenáša špinavými rukami.

Ak si neumyjete ruky, môžete ohroziť svoje
zdravie a zdravie svojich najbližších.

Ak je niekto nosičom žltáčky, môže nakaziť
iných podaním ruky alebo prípravou jedla.

Príznaky

- 1 únava
- 2 zvýšená teplota
- 3 bolesť svalov a kĺbov
- 4 bolesti brucha a strata chuti do jedla
- 5 žlté sfarbenie pokožky a očných bielok

Čas od nákazy po prvé príznaky je 15–50 dní

Prevenencia

- 1 dôsledné umytie rúk mydlom
a vodou po použití toalety,
pred jedlom či pred fajčením
- 2 pitie len pitnej vody z
overeného zdroja
- 3 dezinfekcia kľučiek a
toalety



Najúčinnejším preventívnym opatrením je

OČKOVANIE



REGIONÁLNY
ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V BARDEJOVE